




Drenče pro dojnice



Drenče pro dojnice

Drenčování krav, tedy podání nápoje v době telení nebo těsně po něm, není nic nového na světě. Sedláci přece už dávno napájeli krávy po otelení nápoji ze spařených otrub, lněného semínka nebo vojtěškové moučky, doplněné o minerálie. Dnes jenom máme méně času, zato více možností. Drenče je možné rozdělit do dvou velkých skupin, první pro dobrovolné pití, vhodné pro podání těsně po otelení, druhé pro nucené podání sondou, vhodné především pro krávy s metabolickými poruchami. Tyto na rozdíl od první skupiny mohou obsahovat látky pro dojnice neatraktivní nebo nechutné. Samotné drenče je pak možné doplnit například o tekutý propylenglykol.

Jednou z podmínek pro jejich použití je balení, které odpovídá dávce a je tedy jednoduše použitelné pro personál. Z tohoto důvodu jsme u nás instalovali novou balící linku.

(Z přednášky MVDr. Ivo Paulíka: Přechodné období krav)





Drenče pro dojnice

RUMIHELP XXL

drenč pro napájení krav po otelení

RUMIHELP XXL je koncipován jako „energetický nápoj s ochranou jater“. Jeho další funkcí je nastartování činnosti bachoru. Vzhledem k tomu, že základním požadavkem je dobrovolný příjem, byly použity pouze suroviny, které krávy velmi rády přijímají. Ve složení převažují cukry, od jednoduchých, přes disacharidy – laktózu až po pektiny. Ochranně jater napomáhají obdukovaný methionin, cholinchlorid a niacin. Rozvoj bachorové mikroflóry pak podporují kvasinkové kultury a vitaminy skupiny B. Pochopitelně lze RUMIHELP XXL použít i ve směsi s otrubami, lněným semínkem nebo vojtěškovou moučkou. Podobně lze tento přípravek aplikovat i při metabolických poruchách, případně podávat sondou společně s 300 ml propylenglykolu. Hlavní indikací pro tento způsob užití je ketóza.

Způsob použití:

do 10 až 20 litrů vody rozpustíme sáček (600 gr.) RUMIHELPU XXL a dáme vypít. Pokud podáváme nápoj po otelení, je třeba jej nabídnout co nejdříve, tedy dříve, než se dojnice napije vody.



„S metabolickými poruchami si moc nehrajte. Jejich příznaky se dost podobají, četnost výskytu ve stádech je různá. Stanovit diagnózu potřebuje znalosti. Drenče jako RUMILAC podávejte vždy, když se vám kráva nelíbí. Málo žere, má vpadlou hladovou jámu, mazlavé výkaly, suchou srst, svěšené uši apod. Tady podáním drenče nic nepokazíte.“

(z přednášky MVDr. Paulíka)

RUMILAC

drenč pro podání sondou v případě metabolických poruch

Hlavní indikací pro nálev RUMILACU jsou dislokace slezu, ketóza, jednoduchá indigestce spojená se snížením činnosti bachoru nebo podezření na tyto poruchy. V případě ketózy můžete do nápoje přidat 300 ml propylenglykolu přesto, že obsah propionátu je většinou plně dostatečný. RUMILAC je dobré podávat vždy při regeneraci po prodělané metabolické poruše.

Vojtěšková moučka spolu s otrubami vytváří v bachoru potřebnou matraci (M. Hutjens, 2002), jednoduché cukry spolu s kvasinkami a vitaminy skupiny B obnovují činnost bachoru, sůl společně s chloridem draselným a hořečnatým fosfátem napomáhají nahradit ztráty elektro-

lytů, propionát vápenatý je vynikajícím zdrojem jak vápníku, tak energie. Obdukovaný cholinchlorid jako donor metylových skupin slouží k prevenci ztučnění jater.

Návod na použití:

jeden až dva sáčky rozpustit ve dvaceti litrech vody a podat sondou. Vzhledem k obsahu KCl a propionátu vápenatého nepřijímají nápoj všechny dojnice spontánně.

